

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5102

# สารหาร่าย ไม่ใช่ยาวิเศษ

■ ภ.ญ.อ.ดร.ชุดima จากรัฐคทร์หัวข้อ  
โครงการบริการวิชาการแก่ประชาชน  
คณบดีสาขาวิชาสารคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

## ๙๙ นึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม-ลด ความอ้วนที่ไม่แรงในตอนนี้ ต้องนับ สารหาร่ายเหลว เข้าไปด้วย

แต่ก่อนจะถูกเผยแพร่มาเป็นแบบนี้ ต้องเท่า  
ความเดิมเสียก่อนว่า ในสมัยก่อนคริสต์ศักราชชาว  
โรมันรู้จักนำสารหาร่ายทรายเลมาสกัดทำเป็นเครื่อง  
สำอาง ซึ่งต่อมา ชาวญี่ปุ่นได้นำสารหาร่ายไปทำ  
เป็นอาหารสัตว์ ทำปู หรือสกัดเอาสารไอโอดีน  
ออกมาน้ำประโภชั้น สารหาร่ายมีบริมาณโปรตีนสูง  
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนมากกว่าโปรตีนจากถั่วเหลือง และหาก  
มีการเติมกรดอะมิโนบางตัวจะได้โปรตีนที่มี  
คุณภาพใกล้เคียงกับโปรตีนจากนมวัว

แม้ว่าสารหาร่ายจะไม่มีสารอาหารที่สร้าง  
พลังงานให้แก่ร่างกายมากนัก แต่จะอุดมด้วย  
เกลือแร่ และวิตามินหลายชนิด ในสารหาร่ายจะมี  
เส้นใยอาหาร 40-60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการช่วย  
เพิ่มปริมาณอาหารในลำไส้ทำให้การขับถ่าย  
สะดวกขึ้น ตลอดจนสารฟูโคอิดอน (fucoxanthin)  
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสารที่ด้านโครமะเรงกีมีอยู่ใน  
สารหาร่ายด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรรับประทาน  
สารหาร่ายมากเกินไป เนื่องจากสารหาร่ายมีปริมาณ  
ของกรดนิวคลีอิกสูงเกินไปอันเป็นสาเหตุสำคัญ  
ของการเกิดการดูดซึมสูงในเลือดนำไปสู่การเกิด  
โรคเก้าอี้ และปริมาณของไอโอดีนที่มากเกิน  
ไปก็จะทำให้เกิดอาการไอโอดีนเป็นพิษด้วย

ล่าสุด มีการบรรยายมาใช้เป็นอาหาร  
เสริมชนิดอัดเม็ด เริ่มต้นจากแหล่งอาหารของ  
มนุษย์นั่นไม่เพียงพอต่อประชากรโลก จึงจำเป็น  
ต้องหาแหล่งอาหารใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
อาหารประเภทโปรตีนซึ่งค่อนข้างขาดแคลน  
และได้ผลสรุปว่าสารหาร่ายเป็นพืชที่น่าสนใจ  
เพราะเพาะเลี้ยงง่าย สามารถลัษณะที่แสงสร้าง  
อาหารเองได้ เดียวได้รับดีรับดี เนื่องจาก CGF เป็น  
โปรตีนย้อมจะต้องถูกย่อยอย่างรวดเร็วในทางเดิน  
อาหาร และถูกดูดซึมในรูปแบบกรดอะมิโน  
ธรรมด้า

นอกจากนี้ยังมีปัญหาของสิ่งตกค้างใน  
สารหาร่าย เช่น โลหะหนังจำพวกปรอท ตะกั่ว และ  
สารโพลีไซคลิก อาร์โอมิคไฮโดรคาร์บอน  
(polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเป็น

ของเสียจากโรงงานปิโตรเคมีที่นำ  
มาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสารหาร่าย ซึ่ง  
สารเคมีกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม  
เดียวกันกับสารก่ออมมิเรงที่เกิด  
จากการปั่นหรือย่างเนื้อสัตว์ด้วย  
ไฟแรง นั่นเอง

สารหาร่ายอัดเม็ดที่มีจำหน่าย  
ในประเทศไทย ทำมาจากสาร  
หาร่าย 2 ชนิดคือ คลอเรลลา  
และ สปิรูลิน่า หรือสารหาร่าย-  
เกลียวทอง ซึ่งสารหาร่ายชนิดหลังนี้สามารถผลิตได้เองภายใน  
ประเทศ รูปแบบของสารหาร่ายที่มีจำหน่ายมีทั้ง  
ชนิดเม็ด ชนิดผง ชนิดที่ผสมแลชีทิน หรือที่เป็น  
น้ำเชื่อมโดยผสมกับน้ำผึ้งก็มี สารหาร่ายคลอเรลลา  
มีผงน้ำเซลล์ที่ย่อยยากมากในร่างกายมนุษย์ จึง  
ต้องทำการแยกผงเซลล์ออกเสียก่อนเพื่อให้  
ร่างกายย่อยสลายสารหาร่ายได้ง่ายขึ้น

สารอาหารในคลอเรลลาประกอบด้วย  
โปรตีนในบริมาณสูง รองลงมาเป็นกรดบิโซเดต  
ไขมัน คลอโรฟิลล์ วิตามินเอในรูปของเบต้า-  
แคโรทีน และคลอเรลลา โกรธ แฟคเตอร์  
(chlorophyll growth factor) หรือ CGF ซึ่งมี  
ประโยชน์ในเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ร่างกาย  
กลับสู่ปกติ แต่ยังไม่มีรายได้ระบุแน่ชัดว่า CGF  
นั้นเมื่อยู่ร่วมในคลอเรลลา และถ้าเมื่อยู่ร่วงก็อาจ  
ไม่มีประโยชน์ได้เกิดขึ้น เนื่องจาก CGF เป็น  
โปรตีนย้อมจะต้องถูกย่อยอย่างรวดเร็วในทางเดิน  
อาหาร และถูกดูดซึมในรูปแบบกรดอะมิโน

โปรตีนในคลอเรลลา มีสารเมทิโอนีน  
(methionine) น้อยกว่าโปรตีนในเนื้อสัตว์ซึ่งเป็น  
ข้อดีในผู้ป่วยโครมะเรง เพราะมีเรงจะเริญดีบ  
ต่อได้ด้วยสารเมทิโอนีน จึงเหมาะสมที่จะใช้คลอ-  
เรลลาเป็นแหล่งโปรตีนของผู้ป่วยโครมะเรงผลที่  
อาจเกิดขึ้นตามมาเมื่อมีการรับประทานคลอเรลลา  
คือ อาการผดผื่นเนื่องจากการปั่นตัวของลำไส้คือ  
ขัน มีไข้ต่ำ มีตุ่มหรือผื่นแพ้ คัน มีแผลเปื่อย ถ้า  
เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงควรหยุดดู

สารหาร่ายอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณภาพดีในการรักษา  
จะนำมาทำเป็นสารหาร่ายอัดเม็ดคือสารหาร่ายเกลียว  
ทอง สารหาร่ายชนิดนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนใน  
หลักษณะ เกลือแร่ และวิตามินเอในรูปของ  
เบต้า-แคโรทีน เช่น เดียว กับคลอเรลลา  
ซึ่งวิตามินนี้จะช่วยเร่งสีเนื้อปลาทำให้ปลาสีสวยงาม  
และทำให้สัตว์ปีกมีไฟแสดงสีสวยงาม

ส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญอีกอย่างใน  
สารหาร่ายเหลวคือ ไอโอดีน (iodine) ซึ่งอยู่ในรูป  
แบบของสารประกอบอินทรีย์ เมื่อรับประทาน  
เข้าไปสารหาร่ายจะถูกย่อย และไอโอดีนจะแยก  
ออกมานอกรูปของสารประกอบอินทรีย์ ผ่านไป  
ตามกระแสเลือดเป็นไอโอดีด (iodide) อิสระ  
หรืออยู่ในรูปที่จับกับโปรตีนในกระแสเลือด ซึ่ง  
รูปแบบหลังนี้จะมีผลต่อการทำงานของต่อม  
ไพรอยด์ หากร่างกายขาดไอโอดีนจะทำให้ระบบ  
เผาผลาญอาหาร ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ  
ผิดปกติไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเริ่มต้นจะเกิดเป็น  
โรคคอพอกก่อนแล้วพัฒนาไปสู่การทางสมอง  
ที่เรียกว่า 'โรคอ่อน' ซึ่งจะทำให้ร่างกายพิการ  
บัญญาอ่อน

อย่างไรก็ตามความสามารถทางแหล่งของไอ-  
โอดีนได้จากเกลือไอโอดีนที่นำมารุกษาและ  
น้ำยาไอโอดีน ที่มีราคาถูกโดยไม่ต้องพึงพา  
สารหาร่ายอัดเม็ดที่มีราคายัง

แต่แนวโน้มในการนำสารหาร่ายเหลวมาใช้ใน  
การรักษาโรคต่างๆ ก็มี ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเนื้องอก  
(antitumor) โดยพบว่า sulfated peptido-  
glycuronoglycan หรือ sulfated gly-  
curonoglycan สามารถยึดระยะเวลาการเติบ  
โตของเนื้องอกที่ต่อมน้ำนม และที่ลำไส้ของหนู  
ขาวได้อย่างชัดเจน โดยมีกลไกการออกฤทธิ์  
ที่เป็นไปได้คือ ยับยั้งจุลทรรพที่ก่อมะเรงในลำไส้  
ใหญ่ จับสารที่เป็นพิษแล้วขับออกจากร่างกาย  
และการดูดซึมในรูปแบบกรดอะมิโนใน  
ร่างกาย เป็นต้น

ยังมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต โดยทดลอง  
ใช้ได้ผลกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดอ่อน  
และฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด โดยกระต่าย  
ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน จะมีน้ำตาลใน  
เลือดลดลง

ทั้งเป็นตัวชักนำในการคลอดบุตร การทำ  
แท้งสารหาร่ายที่นำมาใช้ต้องทำให้ปลดเชือก  
ต้องสอดเข้าทางช่องคลอด สารหาร่ายเหลวที่ยังไม่  
ให้ช่องคลอดขยายตัวโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติใน  
การดูดนำร่วมกับกลไกทางชีวเคมี และเชิงกล  
ในการกระตุ้นให้ปากมดลูกเปิด นอกจากนี้ยังใช้  
สารหาร่ายเพื่อยับยั้งช่องคลอดในการชุดเนื้องอก  
ในมดลูก โดยเฉพาะในรายที่เป็นมะเรงเยื่อบุ  
โพรงมดลูก และห้ามใช้ยาลบ

ประโยชน์อีกอย่างคือ ใช้ปิดปากแผล โดย  
ได้มีการพัฒนาวัสดุปิดแผลที่สลายตัวได้เองจาก  
สารหาร่ายเหลว ซึ่งมีคุณสมบัติในการซึมซาบสูง  
สามารถนำมาใช้ปิดแผลที่มีเลือดและน้ำเหลือง  
ซึ่งเจลนี้จะดูดซับน้ำเหลือง และเลือดได้ดี และ  
ป้องกันการติดเชื้อได้ด้วย