

สมุนไพรที่ใช้ลดอาการไอ ระคายคอจากเสมอ

พะเยาว์ เหมือนวงศ์ญาติ

อาการไอ เจ็บคอ ระคายคอ อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่สำคัญคือการติดเชื้อ จำกัด เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเป็นการเจ็บคอ มีไอแห้งๆ หรือมีเสมหะเล็กน้อย เป็นอาการร่วมในการเป็นหวัด ยาที่ใช้ลดอาการไอ เจ็บคอ และระคายคอจากเสมออาจจะอ่อนทึบที่แตกต่างกัน ขอกไป ตัวอย่างเช่น ยาแก้ไอที่ทำให้ชุ่มชื้นเหลว ลดอาการไอ ยาแก้ไอที่ช่วยลดอาการไอและขับเสมหะยาแก้ไอบางชนิด ช่วยลดอาการอักเสบและฆ่าเชื้อโรค

สำหรับสมุนไพรที่จะเสนอแนะนี้ จะไปช่วยลดอาการไอ ขับเสมหะ และยังทำให้ชุ่มคอด้วย

ชิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Rosc วงศ์ Zingiberaceae

ชื่ออื่นๆ ชิงแกลง ชิงแดง (จันทบุรี) ชิงเผือก (เชียงใหม่)

ชื่อสามัญ ginger

ชิงเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า เนื้อเหง้ามีสีขาวนวล ถ้าชิงแก่สีจะเข้มขึ้นและรสเผ็ดจัด ลำต้นเหนือดินสูงประมาณ 0.75 – 1.00 เมตร ในเดียว เรียวยวแคบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ออกลับกัน ดอกช่อ ก้านช่อต่อกลมยາ 15-20 ซ.ม. งอกออกมากจากเหง้าใต้ดิน ช่อดอกมีใบประดับสีเหลืองอมเขียวจัดเรียงกันแน่นเป็นรูปแหลมหัวแหลมท้ายตรงกลางป่อง กลีบดอกสีเหลือง ปลายกลีบสีม่วงแดง บอบบาง ดอกบานครั้งละ 2-3 ดอก จากล่างขึ้นข้างบน

พะเยาว์ เหมือนวงศ์ญาติ. "สมุนไพรที่ใช้ลดอาการไอระคายคอจากเสมอ" นิตยสารวิทยาศาสตร์ 19, 13 (ก.ย.-ธ.ค. 2537) 33-36

ซึ่งชอบดินปนทราย ที่อุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างชื้นชื้น แต่ต้องระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบน้ำขัง และแสดงเดดพอควร ขยายพันธุ์โดยใช้เหง้าแก่

ใช้เหง้าแก่สอดหรือแท่งในทางยา เหง้าอ่อนใช้เป็นอาหาร รสเผ็ดร้อน หวาน ในเหง้าขิง มีน้ำมันหอมระ夷 0.2-3% ประกอบด้วย menthol, cineol ฯลฯ มีฤทธิ์ขับลม แก้อาการท้องท่องเพื่อ มีสารที่ออกฤทธิ์ขับน้ำดีช่วยย่อยไขมันได้แก่ borneol, fenchone ฯลฯ สารที่มีรสเผ็ด จึงแก่เป็นสาร oleoresin มีเช่น 6-shogaol, 6-gingerol, และยังช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องที่มีการเกร็งตัว

การใช้จังบรรเทาอาการไอ ที่มีเสมหะ ใช้ชิงแก่สอดผนกับน้ำมะนาว แกรกเกลือใช้กวดหรือจิบปอยๆ ถ้าจะจิบให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อย

ชิงยังใช้เป็นยาขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ชูกเสียด

โดยนำขิงแก่สอด ขนาด 2 หัวแม่มือ น้ำหนักประมาณ 5 กรัม ทุบให้แตกและต้มกับ พอเดือด ดีมแต่น้ำ 3 เวลาหลังอาหาร

นอกจากนั้นยังใช้ป้องกันการคลื่นไส้อาเจียน เมารถเมารือ

วิธีการใช้ ใช้เช่นเดียวกับใช้เป็นยาขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

ซึ่งใช้เตรียมอาหารทั้งความหวาน เช่นขิงอ่อนใช้ผัดขิงกับไก่หรือหมู ใช้รับประทานกับ พอกไก่สามอย่าง เมี่ยงคำ ฯลฯ ชิงแก่ใช้ต้มใช้หวาน ขนาด 5 ช้อน มีฤทธิ์ช่วย ควรใช้ชิงที่ไม่และไม่อ่อนเกินไป เพราะถ้าจิบแก่จัดจะมีรสเผ็ดทำให้ไม่น่าดื่ม และยังใช้ต้มอาหารเช่น ชิงดองเค็ด ของหวาน และอื่นๆ และชิงยังเป็นพืชเศรษฐกิจ ไทยส่งขึ้นอ่อนออกประเทศ

ยอด

ชื่อวิทยาศาสตร์ **Morinda citrifolia** Linns วงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่นๆ ยอดบ้าน (ภาคกลาง) มะตาเลือ (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ Indian Mulberry


ยอดเป็นไม้ต้นขนาดย่อม ใบเดี่ยว หนา มีขนาดใหญ่ มีญูใบอยู่ระหว่างโคนก้านใบ ดอกช่อออกที่ซอกใบ ดอกจะอัดกันอยู่ในฐานรองดอกที่คลุมกลีบดอกลีขขาว ผลกลมยาวรีเป็นผลรวม ผิวเป็นตุ่มพอง ผลติดมีลักษณะเรืองแสง ผลสุกสีขาวนวล นิ่ม มีกลิ่นเหม็นคลื่นໄส

ยอดลูกโดยใช้เมล็ดจากผลแก่ ขึ้น่ายมาก

ใช้ผลติดหรือจวนห่ำม มีรสขมเล็กน้อย

ในผลยอมีสารหลา吝ชนิด เช่น asperuloside ฯลฯ

การใช้ผลยօรงจับอาการคลื่นไส้อาเจียน เมารถเมารือ โดยใช้ผลติดฝานเป็นชิ้นบาง



คั่วไฟอ่อนให้เหลือง ใช้ต้มหรือชงน้ำ ใช้ครั้งละ 2 กำมือ หรือ 10-15 กรัม น้ำใช้จิบไปเรื่อยๆ จะช่วยระงับอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้

ยอดจะใช้เป็นยา ใบสดใช้ปรุงอาหาร เช่นใช้แกงคั่ว หรือใช้เป็นผักกรองห่อหมก ผลสุกอม เป็นยาขับประจำเดือน รากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลือง

กะเพรา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Qeimum sanctum* Linn วงศ์ Labiatae

ชื่ออื่นๆ กอมก้อ กอมก้อคง (เขียงใหม่) กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง)

ชื่อสามัญ Holy Basil, Sacred Basil

กะเพรามี 3 ชนิด คือกะเพราขาว กะเพราแดง และกะเพราลูกผสมระหว่างกะเพราแดงกับกะเพราขาว กะเพราเป็นไม้ต่ำกว่าไม้พุ่ม โคนต้นเป็นเนื้อไม้สูง 0.8-1.5 เมตร กิ่งก้านใบมีขน กิ่งก้านส่วนปลายจะอ่อนและเป็นสีเหลือง ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ในรูปไข่กลม ทุกส่วนของพืชมีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อยาว กลีบดอกสีขาว-สีชมพูอมม่วง มีใบประดับสีม่วงรองรับดอกอยู่ผลเป็นผลแห้ง มีผลย้อย 4 ผลต่อ 1 ดอก

กะเพราขาว กิ่งอ่อนสีเขียว กิ่งก้านแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อน ในสีเขียวอ่อนดอกสีขาว



กะเพราแดง กิ่งก้านใบสีม่วงแดงป่นน้ำตาล ตอกสีช้มพูมม่วง

กะเพราลูกผสม กิ่งก้านสีม่วงอมแดงใบสีม่วงแดงอมเขียว

กะเพราแดง มีรสแรงกว่า และสรรพคุณสูงกว่ากะเพราชนิดอื่นๆ

กะเพราขยายพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ดแก่ หรือใช้กิ่งที่ไม่แก่และอ่อนแก่ในไปปักชำ สามารถขึ้นได้ในดินทุกราย

ใบสดมีน้ำมันหอมระ夷 ประกอบด้วย ocimol engenol ฯลฯ

ใบกะเพราใช้ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ใช้ใบและยอดประมาณ 1 กำมือ น้ำหนักสด 25 กรัม ต้มพอเดือดกับน้ำ ดื่มวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร

ใบกระเพราใช้ขับลมแก้ท้องอืด ห้องฟื้อ จุกเสียดแน่น วิธีการใช้ ใช้เช่นเดียวกับใช้ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากมีน้ำมันหอมระ夷 คนไทยสมัยก่อนนิยมรับประทานแกงเลียง ใบกระเพราหลังคลอด เพื่อบำรุงธาตุให้ปกติและช่วยขับลม ส่วนในชาวป្រៃງอาหารเพื่อช่วยขับน้ำนมในหญิงเพิ่งคลอด

น้ำที่คั้นจากใบ มีฤทธิ์ขับเหื่อ ขับเสมหะ ถ้าทำทากาย nokแก้โรคผิวหนังกลาก น้ำมันหอมระ夷ของกะเพรามีฤทธิ์ไล่ยุง หรือใช้ใบสดขี้ยว้างข้างตัวช่วยไล่ยุงได้

ใบกะเพราสด ใช้ปรุงอาหาร เช่นผัดเผ็ดใบกะเพรา ใส่แกงป่า

ชาวอินดู ถือว่ากะเพราเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ นิยมปลูกไว้ตามโบสถ์และที่บ้าน

